

			Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)														
			Data de Sementeira														
			01/04/2023			15/04/2023			01/05/2023			15/05/2023			01/06/2023		
Estação	ET <sub>o</sub> (mm)	P (mm)	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.
Alpiarça	33,2	2,2	42	45	51	38	40	46	31	33	38	24	26	29	22	23	26
Pinheiro Grande	34,6	0,0	46	49	55	42	44	50	35	37	42	27	29	33	25	26	30
Riachos	36,8	1,0	48	51	58	44	46	52	36	38	43	28	30	34	25	27	30
Barrosa	36,2	0,4	48	51	58	43	46	52	36	38	43	28	30	34	25	26	30
Coruche	35,7	0,0	48	50	57	43	46	52	36	38	43	28	29	33	26	27	31
Couço	39,0	0,0	52	55	62	47	50	57	39	41	47	31	32	37	27	28	32
Magos	34,0	0,0	45	48	54	41	43	49	34	36	41	27	29	33	25	26	29
Maranhão	39,1	0,0	52	55	63	47	50	57	39	41	47	31	32	37	27	28	32
Montargil	36,0	0,0	48	51	58	43	46	52	35	38	43	28	29	33	24	26	29

### Notas:

- (1) **As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ET<sub>o</sub> da semana de 12-06-2023 a 18-06-2023**
- (2) ET<sub>o</sub> - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Gravidade 60%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.
- (6) Na determinação das necessidades em água considerou-se um ciclo cultural com uma duração de 150 dias.

### Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteoro lógica. O milho com sementeira a 01 de abril está na fase mais sensível em necessidades de água (fase intermédia – entre a floração e o início da maturação), o milho com sementeira entre 15 de abril e 15 de maio encontra-se na fase de desenvolvimento rápido em que as necessidades de água são crescentes, e o milho com sementeira a 01 de junho encontra-se na fase inicial em que as necessidades de água são mais baixas.

