

Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)																	
Data de Sementeira																	
Estação	ETo (mm)	P (mm)	01/04/2023			15/04/2023			01/05/2023			15/05/2023			01/06/2023		
			Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.
Alpiarça	28,6	0,0	21	22	25	34	36	40	38	40	46	38	40	46	38	40	46
Pinheiro Grande	33,0	0,0	24	26	29	39	41	47	44	47	53	44	47	53	44	47	53
Riachos	37,3	0,0	27	29	33	44	47	53	50	53	60	50	53	60	50	53	60
Barrosa	31,1	0,0	23	24	27	37	39	44	41	44	50	41	44	50	41	44	50
Coruche	32,7	0,0	24	25	29	38	41	46	44	46	52	44	46	52	44	46	52
Couço	36,0	0,0	26	28	32	42	45	51	48	51	58	48	51	58	48	51	58
Magos	31,9	0,0	23	25	28	38	40	45	43	45	51	43	45	51	43	45	51
Maranhão	35,7	0,0	26	28	32	42	44	50	48	50	57	48	50	57	48	50	57
Montargil	34,3	0,0	25	27	30	40	43	48	46	48	55	46	48	55	46	48	55

### Notas:

- (1) **As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ETo da semana anterior.**
- (2) ETo - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Gravidade 60%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.
- (6) Na determinação das necessidades em água considerou-se um ciclo cultural com uma duração de 150 dias.

### Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeira de 01 a 15 de abril está na fase final ou de senescência, em que as necessidades de água são decrescentes. E o milho com sementeira entre 1 de maio a 1 de junho está na fase mais sensível em necessidades de água (fase intermédia – entre a floração e o início da maturação).