

			Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)											
			Data de Sementeira											
Estação	ET _o (mm)	P (mm)	01/05/2025			15/05/2025			01/06/2025			15/06/2025		
			Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.
Aljustrel	36,5	0,0	35	37	42	30	31	36	29	30	34	29	30	34
Alvalade do Sado	37,9	0,0	36	38	44	31	33	37	30	32	36	30	32	36
Beja	40,8	0,0	39	41	47	32	34	39	32	33	38	32	33	38
Elvas	46,4	0,1	38	40	45	32	33	38	30	32	36	30	32	36
Estremoz	39,2	0,0	35	37	42	29	30	34	28	30	33	28	30	33
Évora	36,5	0,0	36	38	43	30	31	36	29	31	35	29	31	35
Ferreira do Alentejo	37,4	0,0	32	34	38	28	29	33	27	28	32	27	28	32
Moura	33,2	0,0	37	39	44	30	32	36	29	31	35	29	31	35
Odemira	38,6	0,4	34	36	41	28	30	34	27	28	32	27	28	32
Redondo	36,2	0,0	36	38	43	31	32	37	29	31	35	29	31	35
Serpa	37,7	0,1	42	45	51	34	36	41	34	36	40	34	36	40
Viana do Alentejo	44,0	0,0	34	36	41	30	31	36	28	30	34	28	30	34
Vidigueira	35,4	0,0	39	42	47	32	34	39	32	33	38	32	33	38

Notas:

- (1) **As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ET_o da semana anterior.**
- (2) ET_o - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Cobertura T. 75%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.
- (6) Na determinação das necessidades em água considerou-se um ciclo cultural com uma duração de 135 dias.

Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeira entre 01 e 15 de junho encontra-se na fase inicial em que as necessidades de rega são mais baixas. No início desta fase deve-se fazer a gestão da rega de modo a garantir a emergência da cultura. O milho com sementeira a 01 e 15 de maio está na fase de desenvolvimento rápido em que as necessidades de rega são crescentes.