

## Boletim das Necessidades de Rega do Milho Região Médio Tejo e Sorraia Semana 30-06-2025 a 06-07-2025



			Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)  Data de Sementeira												
			01/05/2025			15/05/2025			01/06/2025			15/06/2025			
Estação	ETo (mm)	P (mm)	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	
Alpiarça	36,4	0,0	42	45	51	34	37	41	26	28	32	26	28	32	
Pinheiro Grande	36,4	0,0	42	45	51	35	37	42	27	29	33	27	29	33	
Riachos	36,0	0,0	42	44	50	34	36	41	27	28	32	27	28	32	
Barrosa	38,6	0,0	45	47	54	37	39	44	28	29	33	28	29	33	
Coruche	37,9	1,0	43	46	52	35	37	42	26	28	32	26	28	32	
Couço	41,3	0,0	48	51	57	39	41	47	30	32	36	30	32	36	
Paul Magos	28,6	0,0	33	35	40	27	29	33	21	22	25	21	22	25	
B. Magos	36,7	0,0	41	43	49	33	35	40	27	28	32	27	28	32	
B. Maranhão	35,2	0,8	40	42	48	33	35	39	26	27	31	26	27	31	
B. Montargil	33,1	6,3	33	35	39	26	20	31	19	20	22	19	20	22	

## Notas:

- (1) As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ETo da semana anterior.
- (2) ETO Evapotranspiração de referência (mm); P Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Cobertura T. 75%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.
- (6) Na determinação das necessidades em água considerou-se um ciclo cultural com uma duração de 135 dias.

## Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeira entre 01 e 15 de junho encontra-se na fase inicial em que as necessidades de rega são mais baixas. No inicio desta fase deve-se fazer a gestão da rega de modo a garantir a emergência da cultura. O milho com sementeira a 01 e 15 de maio está na fase de desenvolvimento rápido em que as necessidades de rega são crescentes.





