

			Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)											
			Data de Sementeira											
			01/05/2025			15/05/2025			01/06/2025			15/06/2025		
Concelho	ET <sub>o</sub> (mm)	P (mm)	Gota a Gota	Pivot	Gravidade	Gota a Gota	Pivot	Gravidade	Gota a Gota	Pivot	Gravidade	Gota a Gota	Pivot	Gravidade
Coimbra	41,0	0,0	51	54	77	43	45	64	34	36	51	30	31	45
AH Baixo Mondego - Coimbra	32,3	8,0	33	35	50	26	28	40	20	21	30	17	18	25
Estarreja	35,2	0,0	44	47	66	37	39	55	29	31	44	26	27	39
Leiria	37,1	0,0	46	49	70	39	41	58	31	33	46	28	29	41
Montemor-o-Velho	41,0	0,0	51	54	77	43	45	64	34	36	51	30	31	45
AH Baixo Mondego - Montemor-o-velho	36,6	0,0	46	48	69	38	40	57	31	32	46	27	29	41

**Notas:**

- (1) **As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ETo da semana anterior**
- (2) ETo - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Gravidade 60%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.
- (6) Na determinação das necessidades em água considerou-se um ciclo cultural com uma duração de 135 dias.

**Comentários:**

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeira a 15 de junho encontra-se na fase inicial em que as necessidades de rega são mais baixas. E o milho com sementeira entre 01 maio e 01 de junho está na fase de desenvolvimento rápido em que as necessidades de rega são crescentes.