

			Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)											
			Data de Sementeira											
			15/04/2026			01/05/2026			15/05/2026			01/06/2026		
Estação	ETo (mm)	P (mm)	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.
Alpiarça	30,9	0,2	41	43	49	35	37	42	29	31	35	26	28	31
Pinheiro Grande	31,9	2,6	40	43	48	34	36	41	28	29	33	25	27	30
Riachos	29,5	5,2	35	37	42	29	30	34	23	25	28	21	22	25
Barrosa	32,3	0,8	42	45	51	36	38	43	30	32	36	27	28	32
Coruche	29,6	0,6	39	41	47	33	35	39	28	29	33	25	27	30
Couço	36,8	0,0	49	52	59	43	45	51	35	37	42	31	33	37
Paul Magos	33,9	2,4	43	46	52	36	38	43	30	32	36	27	28	32
B. Magos	30,1	0,4	40	42	48	34	36	40	28	30	34	26	27	31
B. Maranhão	32,7	0,0	44	46	52	37	39	44	31	33	37	27	29	33
B. Montargil	30,6	0,1	41	43	49	34	36	41	28	30	34	25	27	30

Notas:

- (1) **As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ETo da semana anterior.**
- (2) ETo - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Cobertura T. 75%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.
- (6) Na determinação das necessidades em água considerou-se um ciclo cultural com uma duração de 135 dias.

Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeira a 15 de abril está na fase mais sensível em necessidades de água (fase intermédia – entre a floração e o início da maturação). E o milho com sementeira entre 01 de maio a 01 de junho está na fase de desenvolvimento rápido em que as necessidades de rega são crescentes.