

Boletim das Necessidades de Rega do Milho

Região Médio Tejo e Sorraia

Semana 28-09-2026 a 04-10-2026

			Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)											
			Data de Sementeira											
			15/04/2026			01/05/2026			15/05/2026			01/06/2026		
Estação	ET _o (mm)	P (mm)	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.
Alpiarça	23,4	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	25
Pinheiro Grande	23,4	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	25
Riachos	22,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	24
Barrosa	28,9	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	27	31
Coruche	26,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	25	28
Couço	30,5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29	33
Paul Magos	29,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	31
B. Magos	24,6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	23	27
B. Maranhão	27,6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	26	30
B. Montargil	28,6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	26	30
Açude Gameiro	20,6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	20	22

Notas:

- (1) As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ETO da semana anterior.
- (2) ETO - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Cobertura T. 75%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.
- (6) Na determinação das necessidades em água considerou-se um ciclo cultural com uma duração de 135 dias.

Comentários:

A dotação de rega recomendada para o milho, em condições ótimas, é apresentada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeiras a 01 de junho encontra-se na fase final do ciclo, com necessidades hídricas decrescentes, devendo a rega ser progressivamente reduzida e suspensa próximo da maturação, aproveitando a reserva de água do solo.